

护理您的颈内静脉导管 irf

问题	会发生什么	采取的措施	如何预防
感染	<ul style="list-style-type: none"> • 发热，发寒 • 导管部位发红、肿胀、有脓液 • 可扩散到血液和心脏；可能导致死亡 	<p>立即致电您的医生</p> <p>立即开始使用抗生素</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 保持敷料和胶带不动；工作人员将在透析时更换敷料 • 不要弄湿导管和敷料 • 尽可能少触摸导管 • 尽快使用瘻管、移植植物或 PD 导管
出血、导管松动或脱落	<ul style="list-style-type: none"> • 可能是医疗紧急情况 	<p>用纱布或干净的布按压通道，直到出血停止，并致电医生</p> <p>如果出血不止，或者出血量很大，请拨打 911！</p> <p>不要试图把它放回去或移动它</p> <p>如果可以的话，用胶带固定住导管</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 不要让衣服摩擦或拉扯导管 • 保持敷料和胶带不动 • 不要试图移动导管 • 尽快使用瘻管、移植植物或 PD 导管
凝血 导管堵塞	<ul style="list-style-type: none"> • 可能无法透析 	<p>您可能需要更换导管</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 工作人员每次治疗时都给予血液稀释药物（肝素） • 尽快使用瘻管、移植植物或 PD 导管

护理您的颈内静脉导管，第 2 页 V

问题	会发生什么	应采取的措施	如何预防
敷料变湿、变脏或脱落	<ul style="list-style-type: none"> • 严重感染 感染—— 血液和心脏感染以及死亡 	<ul style="list-style-type: none"> • 小心更换敷料 (通常只有工作人员才应在透析时更换敷料) <ol style="list-style-type: none"> 1. 收集用品： 消毒洗手液、口罩、胶带、纱布 2x2 垫、氟菌拭子 2. 戴上口罩 3. 洗手，然后使用消毒洗手液 4. 轻轻取下旧胶带和敷料 <p>再次使用消毒洗手液</p> <p>使用氟霉菌拭子清洁，从导管部位开始向外清洁</p> <p>让皮肤干燥</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. 用纱布 2x2 垫覆盖，在边缘固定垫子 <p>用胶带粘牢</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 不要弄湿导管——不要洗淋浴 • 尽可能少触摸导管 • 不要让衣服摩擦或拉扯导管 • 尽快使用瘘管、移植物或 PD 导管