

Cuidado de su catéter yugular interno

Problema	¿Qué sucede?	¿Qué hacer?	¿Cómo prevenirlo?
Infección	<ul style="list-style-type: none"> • Fiebre, escalofríos • Enrojecimiento, hinchazón, pus en el sitio del catéter • Puede propagarse a la sangre y al corazón; puede causar la muerte 	<p>Llame a su médico de inmediato</p> <p>Comience a tomar antibióticos de inmediato</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mantenga el vendaje y la cinta en su lugar; el personal cambiará el vendaje en la diálisis • No moje el catéter ni el vendaje • Toque el catéter lo menos posible • Obtenga una fístula, un injerto o un catéter de PD tan pronto como pueda
Sangrado, catéter suelto o que se sale	<ul style="list-style-type: none"> • Puede ser una emergencia médica 	<p>Presione con una gasa o un paño limpio hasta que deje de sangrar y llame a su médico</p> <p>Si no se detiene, o hay mucho sangrado, ¡llame al 911!</p> <p>No intente volver a colocarlo ni moverlo</p> <p>Tape el catéter si puede</p>	<ul style="list-style-type: none"> • No permita que la ropa roce o tire del catéter • Mantenga el vendaje y la cinta en su lugar • No intente mover el catéter • Obtenga una fístula, un injerto o un catéter de PD tan pronto como pueda
Coagulación Obstrucciones del catéter	<ul style="list-style-type: none"> • Es posible que no pueda dializarse 	<p>Es posible que necesite sustituir el catéter</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Medicamentos anticoagulantes (heparina) administrados con cada tratamiento por el personal • Obtenga una fístula, un injerto o un catéter de PD tan pronto como pueda

Cuidado de su catéter yugular interno (IJ),

Problema	¿Qué sucede?	¿Qué hacer?	¿Cómo prevenirlo?
<p>El apósito se moja, se ensucia o se desprende</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Riesgo de enfermedad grave infección: infección de la sangre y del corazón, y muerte 	<ul style="list-style-type: none"> • Cambie el vendaje con cuidado (normalmente, solo el personal debe cambiar el vendaje en la diálisis) <ol style="list-style-type: none"> 1. Reúna suministros: desinfectante de manos, mascarilla, cinta, gasa 2x2, hisopo Chlorascrub 2. Póngase la mascarilla 3. Lávese las manos y luego use desinfectante para manos 4. Retire con cuidado la cinta y el apósito viejos <p>Vuelva a usar desinfectante de manos</p> <p>Use el hisopo Chlorascrub para limpiar, comenzando en el sitio del catéter y moviéndose hacia afuera</p> <p>Deje que la piel se seque</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Cubra con una almohadilla de gasa 2x2, sosteniendo la almohadilla por los bordes <p>Pegue con cinta firme</p>	<ul style="list-style-type: none"> • No moje el catéter, no se duche • Toque el catéter lo menos posible • No permita que la ropa roce o tire del catéter • Obtenga una fístula, un injerto o un catéter de PD tan pronto como pueda